

PSORIASIS CUANDO MENOS TE LO ESPERAS: FENÓMENO DE KOEBNER TRAS BLEFAROPLASTIA NO QUIRÚRGICA



Celia Campoy Carreño¹, Lucía García Almazán¹, Alejandro Javier Castillo Botero¹, Marina Torrent García¹, Tamara Amanda Hernández Gómez¹, Fernando Alarcón Soldevilla¹, Francisco José de León Marrero¹, José Pardo Sánchez¹, Fernando Javier Allegue Gallego¹ y Ángel López Ávila¹ del servicio de Dermatología del ¹Hospital Universitario Santa María del Rosell, Cartagena (Murcia).



INTRODUCCIÓN

Someterse a procedimientos con fines estéticos es algo cada vez más habitual en nuestra sociedad. Una técnica muy popular es la blefaroplastia, un procedimiento que busca rejuvenecer y mejorar la apariencia de los párpados superiores e inferiores. Preguntar por ese tipo de antecedentes personales es esencial, aunque estemos ante pacientes jóvenes.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 18 años que consulta en Urgencias por la aparición de lesiones cutáneas eritemato-descamativas en región facial y tronco de 5 días de evolución. Entre sus antecedentes personales destacaba haberse sometido a una blefaroplastia no quirúrgica con láser plasma pen hacía 14 días. A la exploración física se observa en ambos párpados superiores placas eritemato-descamativas con morfología de semiluna (figura 1a y b), además otras placas de menor tamaño distribuidas en frente y tronco (figura 1c).

La paciente se diagnosticó de psoriasis guttata y se pautó tratamiento tópico con hidrocortisona para el área facial y combinación de calcipotriol/betametasona en espuma para las lesiones del tronco, con resolución de las mismas a las 4 semanas (figura 1d).



Figura 1.

DISCUSIÓN

El fenómeno de Koebner, que consiste en aparición de lesiones típicas de una dermatosis concreta en áreas de piel sana tras gran variedad de traumatismos, es ampliamente conocido en la psoriasis. Está presente en aproximadamente el 25% de los pacientes con esta dermatosis, constituyendo en muchas ocasiones la primera manifestación de la enfermedad. Otras patologías cutáneas con fenómeno de Koebner son el vitíligo y el liquen plano.

Consideramos que el debut de esta patología inflamatoria tras un procedimiento estético es reseñable y debería ser tenido en cuenta a la hora de realizar este tipo de tratamientos, informando de manera adecuada a los pacientes de su posibilidad en función de los antecedentes personales y familiares.

BIBLIOGRAFÍA

- Zhang X, Lei L, Jiang L, Fu C, Huang J, Hu Y, Zhu L, Zhang F, Chen J, Zeng Q. Characteristics and pathogenesis of Koebner phenomenon. *Exp Dermatol*. 2023 Apr;32(4):310-323.
- Mutalik SD, Inamdar AC. Mask-induced psoriasis lesions as Köebner phenomenon during COVID-19 pandemic. *Dermatol Ther*. 2020 Nov;33(6):e14323.
- Ji YZ, Liu SR. Koebner phenomenon leading to the formation of new psoriatic lesions: evidences and mechanisms. *Biosci Rep*. 2019 Dec 20;39(12):BSR20193266.